







189493
e. 93


600043242L





A Monsieur De Blainville
de la part de l'auteur
Edm. De Selys Longchamps

CATALOGUE

DES LÉPIDOPTÈRES

OU

PAPILLONS DE LA BELGIQUE.

LIÉGE. — IMPRIMERIE DE J. DESOER, I

CATALOGUE
DES LÉPIDOPTÈRES

OU

PAPILLONS DE LA BELGIQUE,

PRÉCÉDÉ DU TABLEAU DES LIBELLULINES DE CE PAYS,

PAR

EDM. DE SELYS-LONGCHAMPS,

MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES.



LIÉGE,

J. DESOER, IMPRIMEUR-LIBRAIRE, PLACE St.-LAMBERT.

1837.

CATALOGUE

DES

LÉPIDOPTÈRES OU PAPILLONS DE LA BELGIQUE.

TABLEAU DES LIBELLULINES DE LA BELGIQUE.

Nous ne possédons pas encore de faune de la Belgique, quoique beaucoup de naturalistes zélés et travailleurs explorent depuis plusieurs années notre sol. Un tel ouvrage est cependant desiré et serait utile aux amateurs d'histoire naturelle, ainsi qu'aux jeunes gens qui étudient les sciences dans les nombreux établissemens d'instruction supérieure et moyenne qui existent en Belgique.

Je suis convaincu qu'une association de toutes les personnes qui cultivent la zoologie dans notre pays serait seule capable de publier une bonne Faune Belge, surtout lorsque je considère la diversité de terrains et de végétation que présentent nos provinces. Bien plus, il y a telle localité d'une commune où l'on ne rencontre jamais des insectes fort communs dans une autre partie du même territoire. Les bruyères des Ardennes, les montagnes boisées et les rochers des bords de l'Ourthe et de la Meuse, les marais de la Campine et des Flandres, et les plaines du centre de la Belgique nous offrent presque autant de faunes locales différentes.

Dans l'impossibilité d'entreprendre ce travail bien au-dessus de mes forces, je me suis borné à étudier spécialement une des parties du pays : la province de Liége, et à porter mon

attention sur quelques séries particulières d'animaux : les Vertébrés d'une part, et les insectes Lépidoptères et Névroptères d'autre part, sans avoir pour cela négligé de recueillir tous les autres genres qui se présentaient à mon observation.

J'ai cherché ensuite à établir des relations avec les naturalistes des autres provinces ; et si quelques-uns d'entre eux veulent bien joindre leur tribut d'observations à celles que nous fesons à Liége, je ne doute pas que d'ici à peu de temps nous ne soyons à même de publier en commun la Faune du pays.

Auparavant il me semble que la meilleure marche à suivre serait de rassembler des catalogues raisonnés. Ceux que je publie aujourd'hui pourront donner une idée de la manière dont je les conçois ; le tableau des Libellulines notamment. Quant à celui des Lépidoptères, qui ne sera complété que d'ici à quelque temps, le défaut de temps m'a empêché de donner, comme je compte le faire plus tard, des détails sur les localités qu'habite chaque espèce.

Au reste, j'ai déjà recueilli les documens nécessaires pour soumettre très prochainement au public (en 1838) la Faune des Mammifères et des Oiseaux de la Belgique, avec la description exacte de toutes les espèces. Je prie instamment les personnes qui auraient rassemblé des observations sur ces deux classes, ainsi que sur les poissons d'eau douce, de vouloir bien me les adresser. Elles peuvent être certaines que je me ferai un devoir rigoureux de conserver à chacun la part qui lui appartiendra dans la confection de cette œuvre, qu'on pourrait appeler nationale, si tous y apportaient leur part de collaboration et d'étude.

La Belgique paraît renfermer près de 800 espèces de Lépidoptères. Parmi eux on en remarque un assez grand nombre que l'on regardait comme exclusivement propres aux parties méridionales de la France, et c'est sous ce point de vue que j'ose espérer que la publication de ce catalogue pourra présenter quelque intérêt pour les naturalistes qui s'occupent de la géographie des insectes.

Il m'eût été impossible d'étendre ce travail aux autres pro-

vinces si je n'avais eu le bonheur d'établir des relations suivies avec MM. Polet-de Faveaux et Félicien Fallon pour Námur, et de Koninck pour Louvain et Bruxelles. Tout ce qui dans mon catalogue se rapporte à ces deux provinces est dû en entier aux communications infiniment obligeantes de ces Messieurs. Qu'il me soit permis de leur en témoigner ici toute ma reconnaissance.

Ce travail allait être livré à l'impression lorsque j'ai visité les collections entomologiques de M. le professeur Wesmael (de Bruxelles), qui a publié déjà des monographies pleines de faits nouveaux sur les Hyménoptères de la Belgique. Lui aussi avait rassemblé une collection uniquement composée de Lépidoptères indigènes et il n'a pas hésité à mettre à ma disposition ses nombreuses observations sur ceux du Hainaut et du Brabant, ce qui complètera les familles que je publie aujourd'hui; mais c'est seulement lorsque j'énumérerai nos Noctuélites que l'on pourra juger de la richesse de la collection de M. Wesmael, ainsi que des services qu'il rend à ma publication.

J'ai aussi trouvé à Liége des collaborateurs zélés ; je veux parler de MM. Donckier-Huart et A. Carlier. On verra par le relevé de leurs principales découvertes combien ils ont enrichi la Faune de la province de Liége.

M. Ch. Donckier a particulièrement dirigé son attention sur les environs de Huy et sur quelques parties de l'Ardenne. Je citerai les espèces suivantes comme ayant d'abord été rencontrées par lui : Polyommatus spini, Dorylas, Satyrus arcanius, Hesperia actœon, Fritillum, Sphinx pinastri, Lineata, Sesia nomadæformis, Procris globulariæ, Gastropacha ilicifolia, Harpia fagi, Notodonta trepida, Pygœra curtula, Reclusa, Lithosia ancilla, Aureola.

M. A. Carlier, conservateur de l'Université de Liége, m'a indiqué la Melithea dyctinna, le Sphynx Nerii, les Sesia asiliformis et spheciformis, le Notodonta bicolora, le Psyche albida et plusieurs espèces rares de nocturnes que nous citerons plus tard.

A M. L. de Koninck revient, comme je l'ai annoncé, tout ce

que je dirai des espèces des environs de Louvain, qu'il a explorés avec bonheur ; il m'en a cité de très remarquables, comme : Polyommatus virgaureæ, Argynnis adippe var : Cleodoxa, Paphia var : valezina, Nymphalis populi, Camilla, Hesperia proto, Altheœ, Thyris fenestrina, Sphinx nerii, Celerio, Smerinthus quercus, Synthomis Phegea, Endromis versicolora, Platypteryx unguicula, Notodonta carmelita, Chelonia urticœ.

M. Th. Polet, juge au tribunal de Namur, a rencontré près de cette ville le Polyommatus amyntas, le Sph. Galii, le Bombyx castrensis, les Orgya fascelina et coryli, les Lithosia unita et complanula, et plusieurs Lépidoptères rares que depuis nous avons retrouvés ailleurs.

M. Félicien Fallon, qui a fait des excursions dans les environs de Dinant et de Namur, m'a indiqué les Polyommatus Hylas et Pruni, la Nymphalis populi, les Bombyx betulifolia, Cratœgi, Populi, Tritophus, Dictœoïdes, Dodonœa et l'Emydia cribella.

Je dois à M. Wesmael la connaissance des espèces suivantes : Sesia culiciformis, Hylœiformis, Vespiformis, Bombyx velitaris torva, Dicranura erminea, Lithosia griseola, Muscerda, Platypteryx sicula.

Enfin s'il m'est permis de parler de moi-même, je crois devoir citer parmi mes captures celles des papillons suivans :

Polyommatus arion, Alsus, W—album, Nymphalis iris, Melithea maturna, Cinxia, Satyrus davus, Hesperia Alveus, Fritillum, Sao, Lineola, Sphinx galii, Zygœna lonicerœ, Trifolii, Sesia ichneumoniformis, Hepialus humuli, Bombyx pruni, Liparis V—Nigrum, Sericaria fascelina, Psyche nitidella, Lithosia mundana.

Je ferai observer que quelques-unes de ces espèces ont été reprises depuis par d'autres amateurs.

Voici les localités qui ont paru jusqu'ici les plus riches en Lépidoptères :

PROVINCE DE LIÉGE.

La montagne aride au-dessus du rocher appelé Carrière-du-Prince, située sur l'Ourthe, près de Tilff, en face de Colonster.

Our additional page of localities attached to "Tableau des Libellulines en Belgique

d'Agrion rubella, analis et elegans de cet auteur, qu'elle est la plus voisine. Elle est au contraire très éloignée par les formes d'Agrion sanguinea, avec laquelle elle n'a de commun que la couleur rougeâtre.

Je dois à la générosité de mon collègue et ami M. A. Carlier, de Liége, la possession de l'unique individu de cet espèce qu'il a pris à Angleur, près de Liége, en août 1833.

CATALOGUE

DES

LÉPIDOPTÈRES DE LA BELGIQUE.

OBSERVATIONS ET ABRÉVIATIONS.

L. Province de Liége.
N. Id. de Namur.
B. Id. de Brabant.
A. Ardenne et Luxembourg.
r. Espèce rare.

Les espèces dont le nom n'est pas suivi de l'une ou l'autre de ces lettres se trouvent dans ces quatre provinces, et généralement aussi dans toute la Belgique.

Les chiffres 1 et 2, à la suite du nom des mois, marquent que le papillon paraît dans la première ou dans la seconde quinzaine du mois.

Les astérisques * qui précèdent la dénomination des espèces indiquent celles qui ne se rencontrent que dans les montagnes et les forêts, ou dans de petites localités.

J'ai désigné les collections où se trouvent les papillons qui n'ont encore été pris qu'une seule fois en Belgique (à ma connaissance au moins).

La nomenclature suivie est celle de M. Boisduval : *Index methodicus* (pour les noms spécifiques). Chaque fois que je m'en écarterai, je citerai les auteurs dont j'adopterai les dénominations.

FAMILLE 1re. — DIURNES.

TRIBU 1re. PAPILLONIDES.

Papilio (1) *Latr.*

1. * Podalirius . . . . L. N. A. . mai 2, juin 1.

(1) M. Ch. Comhaire, de Liége, m'assure avoir vu prendre un Parnassius apollo à Esneux, sur l'Ourthe, province de Liége.

2.		Machaon. . . . . Var. *Sphyrus* Hubn. (L.). Var. *Aurantiaca* (B.) (Collect. de M. de Koninck).	mai. juillet. septembre.

Pieris, *Lat.*

3.		Cratægi.	juin.
4.		Brassicæ.	mai. juillet. septembre.
5.		Rapæ.	Presque toute l'année.
6.		Napi . . . . Var. *Nigrovenosa* (Nob.)	mai. juillet. septembre.
7.	r.	Daplidice	juillet 2. 3 septembre.
8.		Cardamines.	avril 2. mai. juin.

Leucophasia, *Devillers.*

9.		Sinapis. . . . . Var. *Erysimi Borkh.*	mai 2, juin 1. juillet 2.

Colias, *Lat.*

10.		Edusa . . . . Var. *Helice* Hubn. tr. rare (Collect. de M. de Sélys).	mai 2, juin 1. août 2, sept.
11.		Hyale.	mai 2. juillet. septembre.

		Gonopteryx, *Leach*.		
12.		Rhamni		juin-juillet. août-sept. hiver.
		Polyommatus, *Lat*.		
13.		Betula		août 2, sept.
14.	* r.	Runi	N.	
15.		Lynceus		juillet 1.
		Var. *Cerri*, Hubn.		
16.	* r.	Spini	A.	juillet 1.
17.	* r.	W-Album		juillet 2.
18.	*	Rubi		mai 2, juin 1.
19.		Quercus		juillet.
20.	*	Amyntas var. Tiresias (1) ?	L. N.	juill. 2, août 1.
		Var. *Minor* (Nob.) tr. rare.	L. N.	mai 2, juin 1.
21.		Xanthe		juin 1. juill. 2, août.
		Var. Fæm. *Obscurior* rare.		
22.		Phlœas		juin-juillet. août 2, sept.
23.	* r.	Chryseis	A.	juillet ?
24.	* r.	Virgaureæ	A. B.	juillet.
25.	*	Hylas	N.	juin ?
26.	*	Ægon		juillet.
27.	*	Agestis	L. N. A.	mai 2, juin 1. juill. 2, août 1.
28.		Alexis		juin. juillet. août-sept.
		Var. Minor. *Nob*.		

(1) Si le Tiresias forme une espèce distincte et si elle est caractérisée par la couleur de la femelle dont les ailes sont *saupoudrées de bleu*, nous n'aurions que le Tiresias en Belgique.

29.	*	r.	Dorylas	L. A.	juillet.
30.	*		Adonis	L. N. A.	juin 1. août.
31.	*		Corydon		juill. 2, août 1.
32.	*		Arion	L. N. A.	juillet.
33.			Argiolus		avril 2, mai 1. juill. 2, août 1.
34.			Acis		juin 1. juill. 2, août 1.
35.	*		Alsus	L. N. A.	mai 2, juin 1. juillet 2.

TRIBU 2e. NYMPHALIDES.

Nemeobius, *Boisd.*

36.	*	r.	Lucina	L. N. A.	mai.

Apatura, *Fab.*

37.			Iris		juin 2, juill. 1.
38.	*	r.	Ilia		juillet.
			Var. *Clythia*. Hubn.	N. B.	juillet.

Nymphalis, *Latr. Bd.*

39.	*	r.	Populi	N. B.	juin 2.
			Var. *Tremulæ Boisd.*	N. B.	

Liminitis, *Fab.*

40.			Sybilla		juillet.
			Var. *Obscurior Nob.* tr. r. (Collection de M. Wesmael.)		
41.	*	r.	Camilla	B.	juin 2.

Vanessa, *Fab.*

42.		r.	Prorsa		mai 1. juillet.
			Var. *Levana auct.*		juillet.

43.		Cardui	juillet. septembre.
44.		Atalanta.	été. avril.
45.		Antiopa	août. avril.
46.		Io.	avril. été.
47.		Polychloros.	avril. juillet-août.
48.		Urticæ	avril. juillet. automne.
		Var. *Ichnusioides* (1), *Nob.*	
49.		C-Album	juillet.
		Var. *Obscurior*, *Nob.*	septembre. mars.

Argynnis, *Fab.*

50.	*	Paphia	juillet.
		Var. Fœm. *Valesina*, *Esp.* N. B.	
51.	*	Aglaïa	juillet, 1.
52.	*	Adippe . . . . B. .	juillet 1.
		Var. *Cleodoxa*, *Esp.* r. . B. .	
53.		Lathonia	mai. été.
54.		Dia.	mai. juillet-août.

(1) Cette variété accidentelle très singulière a été prise une seule fois à Huy. Les taches de ses ailes supérieures ne sont qu'au nombre de quatre, comme dans la *V. ichnusa* de Corse, dont elle imite tout-à-fait les caractères. Elle fait partie de la collection de M. Ch. Donckier.

55. Selene . . . . { juin. août 1.

56. Euphrosine . . . . { mai 2, juin 1. août.

Melithea, *Fab.*

57. * r. Maturna (Collt. de M. de Selys). L. 15 juin.

58. * Arthemis . . . . mai 2, juin 1.

59. Cinxia . . . . juin 1.

60. { Athalia. . . . . mai 2, juin 1.
Var. Navarina, *Nob.* (Alis nigris fascia maculari fulva), tr. r. B.
Var. Hisopa, *Nob.* (Alis fulvis leviter fusco reticulatis inferioribus subtus fere albis), tr. r. L. (Collect. de M. de Selys).

61. * r. Dictynna . . . . juin 1.

Arge, *Boisd.*

62. * Galathea . . . . juillet 1.

Satyrus, *Lat.*

63. Semele. . . . . { du 10 juillet au 10 août.

64. { Janira . . . . juin 2, juill. 1.
Var. *Hispulla*, Hubn.

65. Tithonus . . . . juill. 2, août 1.

66. * Mœra . . . . L. N. A. . . juin-juillet.

67. Megœra . . . . { mai. juill. 2 et presque tout l'été.

68. Ægeria. . . . . { avril 2, mai juillet. octobre, 1.

69. { Hyperanthus . . . . juillet.
Var. *Arete*, *Mull.* rare.

70.	*		Hero	juin.
71.	*		Arcanius	juillet 1.
72.	*	r.	Davus (Collect. de M. de Selys). L.	juin 2.
73.			Pamphilus.	mai 2, juin-juillet-août-septemb. 1.

TRIBU 3e. HESPERIDES.

Hesperia, *Lat.*, *Boisd.*

74.			Lineola . . . L. N. A. . .	juillet
75.			Linea	juin 2, juillet
76.	*		Actæon. . . . L. A. . .	20 juillet.
77.	*		Sylvanus	juin 2, juill. 1.
78.	*		Comma	août.

Steropes, *Boisd.*

79.	*	r	Panicus	mai 2.

Syrichtus, *Boisd. Devillers.*

80.			Tages.	mai 2, juin 1.
81.			Malvæ.	1er. juin. juill. 2, août.
82.	*	r.	Atheæ. (Coll. de M. de Koninck). B.	mai?
83.	*		Alveus? Hubn. (non Ochs.) L. N. A.	juin 1.
84.	*		Fritillum? God (1). . L. A.	20 juillet.
85.			Alveolus. . . . . / Var *Tarras*, Bergstr. *	mai 2, juin.
86.	*	r.	Proto. (Coll. de M. de Koninck). B.	juin?

(1) Je ne suis pas certain que les deux espèces, nommées ici Alveus et Fritillum, répondent bien à celles appelées ainsi par les auteurs. Il se pourrait que notre Fritillum fût le même que celui de Hubner, qui est regardé, à tort, comme une simple variété de taille de l'*Alveolus*. Dans ce dernier cas il faudrait employer une nouvelle dénomination pour le désigner. Je proposerais *Fritilloïdes*. Je donnerai la description et la synonymie exacte de ces deux espèces dans la seconde livraison de ce catalogue.

87.	*	Sao	L. N.	du 15 mai au 8 juin. août 1.

FAMILLE 2e. CREPUSCULAIRES.

TRIBU 1re. SESIAIRES.

Thyris, *God.*

1.	* r	Fenestrina	L. B.	mai 2, juin.

Sesia, *Lat.*

2.		Tipuliformis		juin 1
3.	* r.	Nomadœformis. (Collection de M. Donckier). L.		
4.	* r.	Culiciformis. (Collection de M. Wesmael). B.		
5.	* r.	Mutillæformis		juillet 1.
6.	* r.	Melliniformis		juillet 1.
7.	* r.	Ichneumoniformis		juillet.
8.	* r.	Vespiformis, God . . . / Cynipiformis, Boisd.	B.	
9.	* r.	Chrysidiformis	L.	juin.
10.	* r.	Hylœformis. (Collect. de M. Wesmael)	B.	
11.	* r.	Spheciformis	L. B.	juin ?
12.	* r.	Asiliformis.	L. B.	juin 2.
13.		Apiformis (1)		juin, juillet.

(1) Ochseinheimer mentionne comme de la Belgique une Sesia *Bombeciformis*, qui nous est inconnue.

TRIBU 2ᵉ. SPHINGIDES.

Macroglossa, *Ochs.*

14.		Fuciformis, God.	mai 2, juin 1.
15.	*	Bombyliformis, God.	mai 2, juin 1.
16.		Stellatarum	mai. septembre et presque toute l'année.

Sphinx, *Lat. Ochs.*

17.		Ligustri	juin 2.
18.		Convolvuli	juin. septembre.
19.	r.	Pinastri	juin, juillet.

Deilephila, *Ochs.*

20.	r.	Nerii. . . . . L. B.	septembre (1).
21.		Elpenor.	juin.
22.	r.	Porcellus	juin.
23.	r.	Celerio. (Coll. de M. de Koninck) B.	
24.	r.	Lineata. . . . . L. B.	
25.	r.	Galii.	juillet.
26.		Euphorbiæ.	juin.

Acherontia, *Ochs.*

27.		Atropos	septembre.

Smerinthus, *Lat.*

28.		Tiliæ.	mai.
		Var., rufescens ferè immaculata. (Collect. de M. Donckier).	

(1) On en a pris à diverses époques, mais en 1835 et 1836 il a été assez répandu en Belgique. On sait qu'il en a été de même pour le nord de la France.

29.		Ocellata	mai.
30.		Populi . . . . Var., rufescens, *nob.*	mai, juin 1.
31.	r.	Quercûs. (Coll. de M. de Koninck).	

TRIBU 3e. ZYGENIDES.

Zygœna, *Fab.*

32.		Filipendulæ	juin 2, juill. 1.
33.	r.	Loniceræ . . . . A.	20 juillet.
34.		Trifolii . . . . Var., *Minoïdes nob.* mac. confluentibus.	juin.

Syntomis, *Latr.*

35.		Phegea . . . . B.	juillet.

TRIBU 4e. PROCRIDES.

Procris, *Fab. Lat.*

36.		Statices	juin.
37.		Globulariæ. . . . . . . L.	

FAMILLE 3e. NOCTURNES.

SECTION 1re. BOMBYCES (1).

(*Tribus des Hépialites. — Bombycites et Pseudobombycites*).

TRIBU 1re. HÉPIALITES, *Lat.*

Zeuzera, *Lat.*

1.	r.	Æsculi.	juillet.

Cossus, *Fab.*

2.		Ligniperda	juill., août 1.

Hepialus, *Fab.*

3.		Sylvinus	du 25 août au 3 septembre.
4.	r.	Lupulinus . . . . B.	
5.		. . . (Nov. species ?—Collect. de M. Wesmael). B.	
6.		Hectus. . . . . Var. *Nemorosa. Hubn.*	juin.
7.	r.	Humuli	juin 2.

TRIBU 2e. BOMBYCITES.

Sous-tribu 1re. *Cochliopodi.* Bd.

Limacodes, *Lat.*

8.		Testudo	juin, juill. 1.

(1) Les Hépialites se lient aux crépusculaires par les stygia; les Psychés s'en rapprochent également, tandis que certains chéloniens forment le passage naturel des Zygénides aux Nocturnes, d'une part, et des lithosies aux tineites d'autre part. Dans l'impossibilité de présenter une méthode en harmonie avec ces rapports naturels et avec les nouvelles divisions introduites d'après les premiers états de ces Lépidoptères, je me borne à les donner répartis en petites tribus qui répondent presque toutes à celles de Boisduval. Les Hépialites et les Pseudobombycites (chéloniens) sont bien caractérisés; mais les autres tribus n'offrent guère de caractères communs entre elles.

Sous-Tribu 2e. Bombycini.

Gastropacha, *Ochs.*

9.	r.	Ilicifolia	mai ?
10.	r.	Betulifolia.	mai.
11.	r.	Populifolia	juin, 2.
12.		Quercifolia	juillet.
		Var. alnifolia ? Ochs. (rare). B.	

Lasiocampa, *Schrank.*

13.	r.	Pruni	juillet 1.
14.		Potatoria	vers le 15 juil.
		Var. (Maris colore fæmina).	

Bombyx, *Boisd.*

15.	r.	Trifolii . . . . N. B.	juillet.
16.		Quercûs	juillet.
		Var. (Maris colore fæmina).	
17.		Rubi	mai, juin 1.
18.	r.	Dumeti	octobre.
19.	r.	Populi.	octobre.
20.	r.	Cratægi. (Collect. de M. Fallon.) N.	septembre ?
21.		Processionea	août 1.
22.		Lanestris	mars 2, avril 1.
23.	r.	Castrensis.	juillet?
24.		Neustria	juillet 1.
		Var. (Alis superioribus strigis contiguis).	

Saturnia, *Schrank.*

25.		Pavonia minor	mai.
		Carpini, Boisd.	

Aglia, *Ochs.*

26.		Tau.	avril.

Endromis, *Ochs.*

27. * r. Versicolora . . . . mars 2, avril 1.

Sous-tribu 3. *Aposuri*, Latr.

Platypteryx, *Lasp.*

28.		Falcula	mai-juin.
		Var. Pallida, *Nob.*	août.
29.	r.	Curvatula	juillet 1.
30.		Hamula	mai. juillet.
31.	r.	Unguicula . . . B. . . .	mai? juillet.
32.	r.	Sicula (Coll. de M. Wesmael). B.	
33.		Lacertula.	juin.

Drepana, *Schranck.*

34.		Spinula	juin.

Harpya, *Och.*

35.	r.	Fagi	juin.

Dicranura, *Lat.*

36.		Vinula	mai.
		Var. Minax, Hubn.	
37.	r.	Erminea (Coll. de M. Wesmael). H.	mai?
38.		Furcula	avril-mai.

Sous-tribu 4. *Pseudobombycini.*

Notodonta, *Ochs.*

39.		Camelina.	juillet.
40.	r.	Carmelita (C. de M. de Koninck). B.	juin?
41.		Dromedarius.	juin.
42.	r.	Tritophus.	juin.

43.		Ziczac	mai 2.
44.	r.	Torva (Coll. de M. Wesmael). H.	juin ?
45.	r.	Trepida . . . . Tremulæ god.	juin.
46.	r.	Chaonia.	mai 1.
47.	r.	Dodonæa (Coll. de M. Fallon). N.	mai ?
48.	r.	Melagona (Coll. de M. Fallon). N.	juin ?
49.	r.	Velitaris (Coll. de M. Wesmael). H.	juin ?
50.	r.	Bicolora	
51.		Dictæa	juill. 2, août.
52.	r.	Dictœoïdes	juillet.

Orthorinia, *Boisd.*

53.		Palpina	juin.

Pygœra, *Ochs.*

54.		Bucephala	mai. juin. juillet.
55.	r.	Anastomosis. . . B.	mai. juillet.
56.	r.	Curtula	mai. juillet.
57.		Anachoreta	avril 2. juillet.
58.	r.	Reclusa	mai. juillet.

Liparis, *Ochs.*

59.	r.	V-Nigrum	juillet 1.
60.		Chrysorrhæa.	juillet.
61.		Auriflua	juillet.
62.		Salicis.	juillet 1.
63.	* r.	Monacha	août 1.

64.		Dispar	juillet 1.
		Var. Mas. *Nigra*, *Nob.*	

Sericaria, *Latr.*

65.		Pudibunda.	avril, mai 1.
66.	* r.	Fascelina.	juillet 1.
67.	r.	Coryli. . . . . N. B.	juillet.

Orgya, *Ochs.*

68.		Antiqua	juillet. sept., octobre.
69.	* r.	Gonostygma. . . . . A. L. N.	juillet? septembre 2.

Sous-tribu 5. *Psychidæ*, Boisd.

Psyche, *Schranck.*

70.	* r.	Nitidella. (Collection de M. de Selys). L. B.	25 mai.
71.	* r.	. . . . . (Collection de M. de Selys). L.	10 juillet.
72.	* r.	Albida. (Collect. de M. Carlier). L.	juin?

TRIBU 3ᵉ. PSEUDOBOMBYCITES. (Chéloniens, *Boisd.*)

Emydia, *Boisd.*

73.	r.	Cribella . . . . . . L. N.	été.

Lithosia, *Ochs.*

74.	r.	Quadra.	juillet.
75.		Griseola	juillet.
76.		Complana (1).	juillet.
77.	r.	Complanula *Duponch.* (Collection de M. Polet) . . . . . . N.	
78.	r.	Unita. (Collect. de M. Polet). N.	

(1) M. Donckier possède une Lithosie qui semble plus voisine de la Gilveola *Ochsenh.*, que de la Complana.

79.			Aureola	mai.
80.			Mesomella.	juin, juillet.
81.		r.	Muscerda. (Collection de M. Wesmael). B.	juillet.
82.			Rosea	juin, juillet.
83.			Rubricollis.	juin 2.
84.	*	r.	Ancilla . . . . . . A. L. N.	juillet.
85.	*		Irrorea.	mai 2, juin 1. juillet.
86.	*	r.	Mundana . . . . Nuda *Hubn.*	juillet 2.

Euchelia, *Boisd.*

87.			Jacobeæ.	juin.

Callimorpha, *Lat.*

88.		r.	Dominula.	juillet 1.
89.			Hera . . . . Var.	juillet 2, août 1.

Chelonia, *God.*, *Lat.*

90.	*	r.	Russula	juin.
91.	*		Plantaginis . . . . Var. Hospita *Bork*	juin.
92.		?	Civica . . . . N?	juin ?
93.			Villica.	mai 2, juin 1.
94.			Caja	juillet, août 1.
95.			Fulliginosa	mai, juin 1.
96.			Mendica	mai.
97.			Urticæ. . . . . B.	juin ?
98.			Menthastri	mai.
99.			Lubricipeda.	juillet 1.

Voir la page 31.

Nota. — La seconde livraison de ce Catalogue comprendra les Noctuélites et les Phalénites.

Elle paraîtra en 1838.

La troisième et dernière livraison contiendra les Pyralites, les Tortricites, les Crambites, les Tinéites et les Ptérophorites.

Le Catalogue sera terminé par un supplément contenant les additions et corrections.

